

摄影：大雨  
设计：小方舟



# 北海 红 树 林 鸟 类



项目名：广西北部湾红树林生态恢复及生态养殖示范项目  
执行机构：北海民间志愿者协会 防城港红树林保护协会



## 前言

红树林是热带、亚热带海岸潮间带特有的胎生木本植物群落，素有“海上森林”之称，幽秘神奇、倚海而生，随潮涨而隐、潮退而现，是国家级重点保护的珍稀植物。北海山口镇的国家级红树林自然保护区位于广西北海市合浦县境内，海岸线长50公里，面积8000公顷，光热充足，港湾深入内陆，封闭好，海水污染程度低，理化性质稳定，滩涂淤泥肥沃，适宜于红树林生长，保护红树林面积为7.2平方公里，共有红海榄树、秋茄、桐花树等12种红树林植物，是广西乃至全国大陆海岸发育良好，连片大，结构较典型，保护较完整的红树林区。

1990年10月被国务院列入首批国家五个海洋自然保护区之一。1991年5月被国家海洋局和广西壮族自治区人民政府定为“国家级山口红树林生态自然保护区”。

我们亲切称之为“海上森林”的红树林还是鸟类的天堂，景区的红树林里栖息着各种各样的海鸟，其中数量最多的是白鹭鸟，群群白鹭在林间觅食玩耍，怡然自得，偶尔被渔人惊起，百鸟飞翔的景象，蔚为壮观，在这里可以感受“落霞与孤鹭齐飞，秋水共长天一色”的原生态自然美景和美好意境。



## 目录

|        |    |           |         |    |          |
|--------|----|-----------|---------|----|----------|
| 白鹭(幼鸟) | 01 | 红树林主要栖息鸟类 | 仙八色鸫    | 16 | 红树林可观测鸟类 |
| 大白鹭    | 02 |           | 黑枕黄鹂    | 17 |          |
| 白胸苦恶鸟  | 03 |           | 灰山椒鸟    | 18 |          |
| 栗喉蜂虎   | 04 |           | 环颈鸽(幼鸟) | 19 |          |
| 须浮鸥    | 05 |           | 鹊鸂      | 20 |          |
| 勺嘴鹬    | 06 |           | 黑翅鸢     | 21 |          |
| 斑鱼狗    | 07 |           | 阿穆尔隼    | 22 |          |
| 水雉     | 08 |           | 发冠卷尾    | 23 |          |
| 红嘴鸥    | 09 |           | 棕腹大仙鹡   | 24 |          |
| 中杓鹬    | 10 |           | 大山雀     | 25 |          |
| 蓝翡翠    | 11 |           | 东方角鸮    | 26 |          |
| 小鸮鹟    | 12 |           | 山蓝仙鹡    | 27 |          |
| 反嘴鹬    | 13 |           |         |    |          |
| 火斑鸠    | 14 |           |         |    |          |
| 鸮      | 15 |           |         |    |          |



红树林湿地生态系统一般包括红树林、滩涂和基围鱼塘三部分。一般由藻类、红树植物和半红树植物、伴生植物、动物、微生物等生物因子及阳光、水分、土壤等非生物因子所构成。分解者种类和数量均较少，且以厌氧微生物为主，有机体残体分解不完全。消费者主要是喜湿鸟类尤其是水鸟和鱼类，底栖无脊椎动物、昆虫，两栖动物、爬行动物亦较常见，哺乳动物种类和数量较少。

## 美丽的红树林



志愿者们配合  
北海森林公安  
在红树林进行  
拆除鸟网行动



栖息林间的鸟儿



温馨提示：

登高近水时，请注意安全防护，防止小朋友摔倒，坠湖等，保持安静找鸟儿，不可扔东西活动幅度过大易惊扰鸟儿，观鸟过程中请尽量使用科学的语言，养成良好习惯。

红树林主要栖息鸟类



## 白鹭(幼鸟) *Casmerodius albus*

是大中型涉禽，成鸟的夏羽全身乳白色；鸟喙黑色；头有短小羽冠；肩及肩间着生成丛的长蓑羽，一直向后伸展，通常超过尾羽尖端10多厘米，有时不超过；蓑羽羽干基部强硬，至羽端渐小，羽支纤细分散；冬羽的成鸟背无蓑羽，头无羽冠，虹膜淡黄色。





## 大白鹭 *Casmerodius albus*

是大中型涉禽，成鸟的夏羽全身乳白色；鸟喙黑色；头有短小羽冠；肩及肩间着成丛的长蓑羽，一直向后伸展，通常超过尾羽尖端10多厘米，有时不超过；蓑羽羽干基部强硬，至羽端渐小，羽支纤细分散；冬羽的成鸟背无蓑羽，头无羽冠，虹膜淡黄色。





### 白胸苦恶鸟 *Amaurornis phoenicurus*

嘴基稍隆起，但不形成额甲，嘴峰较趾骨为短；跗骨较中趾（连爪）为短；翅短圆，不善长距离飞行。善奔走，在芦苇或水草丛中潜行，亦稍能游泳，偶作短距离飞翔，以昆虫、小型水生动物以及植物种子为食。





### 栗喉蜂虎 *Merops philippinus*

喉部是栗红色的，黑色的过眼纹，翅膀和背部是绿色的，尾翼是蓝色的，飞行时翅膀下面的羽毛是橙黄色的，在阳光的照射下，它们全身闪烁着金属般的艳丽光泽，有人将它称之为中国最美丽的鸟之一。





### 须浮鸥 *Chlidonias hybridus*

体型略小(25厘米)的浅色燕鸥。腹部深色(夏季)，尾浅开叉。繁殖期：额黑，胸腹灰色。非繁殖期：额白，头顶具细纹，顶后及颈背黑色，下体白，翼、颈背、背及尾上覆羽灰色。





勺嘴鹬 *Eurynorhynchus pygmeus*

又名琵嘴鹬或匙嘴鹬，是一种小型的涉禽，仅在极少数的冻土层地带繁殖，并在东南亚的湿地过冬。在2007年的一次由国际鸟盟进行的统计中，勺嘴鹬的数目可能少于100对。



红树林主要栖息鸟类



### 斑鱼狗 *Ceryle rudis*

斑鱼狗身长24-26cm，翼展45-47cm，体重70-95g，寿命4年。体羽以黑白二色为主。与冠鱼狗的区别在体型较小，冠羽较小，具显眼白色眉纹。上体黑而多具白点。





水雉 *Hydrophasianus chirurgus*

体型略大（33厘米）、尾特长的深褐色及白色水雉。飞行时白色翼明显。非繁殖羽头顶、背及胸上横斑灰褐色。初级飞羽羽尖特长，形状奇特。分布于印度至中国、东南亚；南迁至菲律宾及大巽他群岛。





## 红嘴鸥 *Larus ridibundus*

俗称“水鸽子”，体形和毛色都与鸽子相似，嘴和脚皆呈红色，身体大部分的羽毛是白色，尾羽黑色。红嘴鸥数量大，喜集群，在世界的许多沿海港口、湖泊都可看到。一般生活在江河、湖泊、水库、海湾。





### 中杓鹑 *Numenius phaeopus*

体长约43厘米。眉纹浅，具黑色顶纹，嘴基部淡褐色或肉色，嘴长而下弯曲。似白腰杓鹑但体型小许多，嘴也相应短。较常见的亚种 *variegatus* 腰部偏褐，但一些个体腰及翼下为白色。虹膜黑褐色。嘴黑褐色。脚蓝灰色或青灰色。





### 蓝翡翠 *Halcyon pileata*

蓝翡翠身长29-31 cm, 体重71-138g, 寿命10年。是一种以蓝色、白色及黑色为主的翡翠鸟。以头黑为特征, 翼上覆羽黑色, 上体其余为亮丽的蓝紫色。上体辉紫蓝色, 下体其余部分均为棕黄色。





小鸕鷀 *Tachygraphus ruficollis*

主要分布于古北界和东洋界。体较小，翅长约100毫米；眼先、颊、颞和上喉等均黑色；下喉、耳区和颈棕栗色；尾短，呈棕、褐、白等色相间。平时栖息于水草丛生的湖泊。食物以小鱼、昆虫等为主。





反嘴鹬 *Recurvirostra avosetta*

体高（43厘米）的黑白色鹬。形长的腿灰色，黑色的嘴细长而上翘。飞行时从下面看体羽全白，仅翼尖黑色。具黑色的翼上横纹及肩部条纹。虹膜一褐色；嘴一黑色；脚一黑色。脚蓝灰色。





火斑鸠 *Streptopelia tranquebarica*

又称红鸠、红斑鸠、斑甲、红咖追、火鸠鹁，栖息于亚洲南部热带区，为一种小型鸠鸽，常见于平原、草地成群觅食。分布于印度、尼泊尔、不丹、孟加拉、缅甸、中南半岛、菲律宾以及中国大陆等地。





鸞 *Pandion haliaetus*

鸞俗称“鱼鹰”，属于鸟纲，隼形目，鸞科。一种大型无  
害的鹰，世界许多国家都有，上部深褐色，下部纯白，建  
有巨大的巢，常年复一年地使用，用盘旋和急降的方法捕食水  
中的鱼。





仙八色鸫 *Pitta nympha*

为雀形目八色鸫科中等体型的鸟类，身长约20厘米。色彩艳丽，似蓝翅八色鸫，但下体色浅且多灰色，翼及腰部斑块天蓝色，头部色彩对比显著。分布于日本、朝鲜、中国东部和东南部；越冬在婆罗洲。





黑枕黄鹂 *Oriolus chinensis*

嘴与头等长，较为粗壮，嘴峰略呈弧形、稍向下曲，嘴缘平滑，上嘴尖端微具缺刻。幼鸟具纵纹。体色艳丽。主食昆虫，也吃果实和种子。树栖鸟，极少在地面活动，喜集群，常成对在树丛中穿梭。





### 灰山椒鸟 *Pericrocotus divaricatus*

体型略小（20厘米）的山椒鸟。特征为体羽黑、灰及白色。与小灰山椒鸟的区别在眼先黑色。与鹛鹑的区别在下体白色，腰灰。雄鸟：顶冠、过眼纹及飞羽黑色，上部余部灰色，下体白。雌鸟色浅而多灰色。





环颈鸻（幼鸟） *Charadrius alexandrinus*

全长约16cm。属中小型涉禽。羽毛的颜色为灰褐色，常随季节和年龄而变化。尾形短圆，尾羽12枚。是迁徙性鸟类，具有极强的飞行能力。通常沿海岸线、河道迁徙。生活环境多与湿地有关，离不开水。





鹊鸂鶒 *Copsychus saularis*

为雀形目鸂鶒科的鸟类，体长约21厘米，嘴形粗健而直，长度约为头长的一半或比一半略长；鹊鸂鶒性格活泼好动，觅食时常摆尾，不分四季晨昏，在中国内地有“四喜儿”之称。





黑翅鸢 *Eianus caeruleus*

身长约32厘米。通体以灰色为主。头顶、后颈、背部、尾上覆羽和中央1对尾羽的表面概呈银灰色；前额、头部两侧和整个腹面的羽毛均为白色。食物主要是昆虫及小型鼠类、蛙类，有时也捕食小鸟。





## 阿穆尔隼 *Falco amurensis*

体小（31厘米）的灰色隼。腿、腹部及臀棕色。似红脚隼但飞行时白色的翼下覆羽为其特征。繁殖于西伯利亚至朝鲜北部及中国中北部、东北，印度东北部有一记录。迁徙时见于印度及缅甸；越冬于非洲。





发冠卷尾 *Dicurus hottentottus*

体形中等大小。嘴形强健；嘴峰稍曲，先端具钩；嘴须存在。鼻孔为垂羽悬掩。栖息于中、低海拔的丘陵和山地林区，晨昏喜结群活动。食物几乎完全为昆虫，如甲虫、蜻象、蟋蟀、蝗虫等。





棕腹大仙鹟 *Mitava vivida*

中等体型(18厘米)、色彩亮丽的鹟。雄鸟上体深蓝，下体棕色，脸黑，额、颈侧小块斑、翼角及腰部亮丽闪烁辉蓝色。雌鸟灰褐，尾及两翼棕褐，喉上具白色项纹，颈侧具辉蓝色小块斑。





## 大山雀 *Parus major*

大山雀属鸟纲、雀形目、山雀科，一般山雀科的鸟体形都非常小，而大山雀体形较大，全长约有14厘米长。主要捕食松毛虫、天牛幼虫、蝗虫、蝇类等害虫，是农业、林业及果区中极为重要的益鸟。





## 东方角鸮 *Otus sunia*

东方角鸮相貌十分符合公众对猫头鹰形象的成见，圆脸庞，大眼睛，还有一双直立的“耳朵”。东方角鸮十分娇小，即使伸直脖子挺胸抬头也不过两个拳头叠起来这么高，而且浑圆的头部占了很大比例。





山蓝仙鹟 *Cyornis banyumas*

中等体型（15厘米）的蓝、橘黄及白色（雄鸟）或近褐色（雌鸟）鹟。有甜美悦耳的颤鸣声，音程甚复杂。分布于尼泊尔至中国西南、巴拉望岛、东南亚及大巽他群岛。

